

POTILASOHJE

PROSTATABIOPSISIA

Teille on varattu toimenpideaika _____ / _____ klo _____

Lääkärikeskus Aava _____ Lääkäri _____

Prostatabiopsiat eli eturauhasen neulanäytteet otetaan silloin, kun PSA arvo on todettu poikkeavaksi ja lääkärinne haluaa tarkemmin selvittää eturauhasen mikroskooppista rakennetta ja syytä poikkeavaan PSA arvoon. PSA arvon nousu voi johtua eturauhasen liikakasvusta, tulehduksesta, virtsaamisvaivoista tai eturauhassyövästä. Joskus myös eturauhanen voi tuntua sormin tunnustellessa poikkeavalta, jolloin lääkärinne haluaa selvittää asiaa tarkemmin neulanäytteiden avulla.

Patologi tutkii neulanäytteet ja vastaukset saadaan noin kahdessa viikossa.

Eturauhasen neulanäytteet otetaan paikallispuudutuksessa ultraäänilaitteen avulla peräsuolen kautta. Tunti ennen toimenpidettä tulee ottaa antibiootti (yleensä TAVANIC 500 mg), jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä tulehduksia. Näytteidenotto lisää riskiä virtsatieperäiselle tulehdukselle. Toimenpiteen jälkeen virtsa saattaa olla noin viikon verran verisempää ja siemenneste jopa kuukauden ajan rusehtavaa. Näytteenottopäivänä on syytä välttää räsitystä ja saunomista ja suositellaan, että juo normaalia enemmän. Näin virtsa vaalenee nopeammin. Näytteenoton jälkeen saattaa alavatsalla esiintyä kipua. Tarvittaessa kipuun voi ottaa esimerkiksi Buranaa tai Panadolia.

Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos

- Virtsa muuttuu voimakkaan veriseksi
- Nousee kuume
- Ilmaantuu infektio oireita