

AMEEBAVÄRJÄYS ULOSTEESTA

Ameebavärystä ulosteesta käytetään Dientamoeba fragilis -epäilyssä, kun pitkittyneen ripulin tai laihtumisen taustalta ei ole löytynyt muita taudinaiheuttajia.

Näytteenotto

1. Ottakaa ulostenäyte wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan, esim. kertakäyttölautaselle. Ulosteeeseen ei saa olla sekoittuneena virtsaa. Näytteeksi ei sovellu WC-altaasta otettu näyte.
2. Ottakaa näytepurkin korkissa olevalla lusikalla ulostetta nestettä sisältävään näytepurkkiin niin paljon, että nestepinta purkissa nousee punaiseen merkkiviivaan asti. Sulkekaa korkki huolellisesti.
3. Sekoittakaa ulostenäyte tasaiseksi vellimäiseksi seokseksi näytepurkissa olevaan nesteeseen.
4. Kirjoittakaa tarraan nimenne, syntymäaikanne ja näytteenottopäivämäärä ja liimatkaa se näytepurkkiin. Jos on pyydetty useampia näytteitä, ottakaa ne eri päivinä.
5. Toimittakaa purkki laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, viimeistään seuraavana aamuna. Näyte on säilytettävä viileässä, esim. jääkaapissa.
6. Täyttäkää alla olevat tiedot ja toimittakaa ne näytteen mukana laboratorioon.

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Ulkomaanmatkat viimeisen kuuden kuukauden aikana (kohdamaa ja ajankohta):

Huom! Säilytysainetta ei saa kaataa pois.

Toimintaohje aineen joutuessa:

- **iholle:** riisukaa saastunut vaatetus ja peskää iho runsaalla vedellä ja miedolla saippualliuoksella ja rasvatkaa iho
- **silmiin:** huuhdelkaa runsaalla vedellä 10-15 min ja menkää välittömästi lääkäriin
- **suuhun:** juokaa runsaasti nestettä ja menkää lääkäriin. Älkää yrittäkö oksentaa.

Lisätietoja: 010 380 3800 (vaihde)